

# ONEMOCNĚNÍ KŮŽE VYVOLANÉ KOKY

- hnisavé kožní onemocnění ( PYODERMIE)
- bakteriální kožní onemocnění vyvolané vlivem koků = STAFYLOKOKŮ \ STREPTOKOKŮ  
vyskytují se i na zdravé kůži
- ke vzniku dochází při porušení struktury kožního povrchu, narušení kyselého kožního pláště,  
oslabením organismu různými chorobami (svrab, ekzém, opar = mluvíme o IMPETIGINIZACI),  
nedostatečná hygiena

Rozděluje se na povrchní, folikulární a hluboké :

POVRCHNÍ = IMPETIGO

**FOLIKULÁRNÍ = FOLIKULITÍDA ( FOLLICULITIS, PERIFOLLICULITIS)**

**\ FURUNKL – nežid ( FURUNCULUS)**

## \ FURUNKULOZA ( FURUNCULOSIS)

**\ KARBUNKL ( CARBUNCULUS)**

**HLUBOKÉ = RŮŽE ( ERYSIPELAS)**

\ EKYMA

## \ FLEGMONA ( PHLEGMONA)

## IMPETIGO

- nejčastější hnisavé onemocnění, postihuje více děti a mladistvé
- smíšená streptokoková a stafylokoková infekce
- vzniká často : s rýmou ( horná ret)  
: zánět středního ucha ( okolí ušního boltce)
- velmi nakažlivé, rychle se šíří ( dětské kolektivy)

**Projevy :** tvorba drobných puchýřků ( praskají), obsah zasychá ve žluté nebo žlutohnědé strupy po odstranění zůstává mokvající spodina

**Léčba** :nemocný se musí izolovat, zvýšit hygienu( osobní a prádla), užívat masti s antibiotiky, někdy i antibiotika prášky, vhodné koupele v heřmánku, hypermanganu a použití zásypů.  
( FRAMYKOIN, CHLORAMPHENICOL)

**Neléčení se může projevit zánětem ledvin !!!!!**



## FOLIKULITIDA

- infekce vlasového váčku ( folikulu )
- vyvolané nejčastěji STAFYLOKOKY
- mohou být postiženy vlasy, vousy ( SYKOZA) i ochlupení
- rozlišujeme několik klinických forem – AKUTNÍ \ VLEKLÝ = CHRONICKÝ

- střídavě se zlepšuje a zhoršuje
- většinou úporné a obtížně léčitelné onemocnění
- u těžších forem nevratné poškození vlas.váčku s následnou ztrátou vlasu

**Projevy :** infikované váčky drobné neštovičky z nichž vystupuje vlas  
: rozšíření zánětu do hloubky vlas.váčku ( PERIFOLLICULITIS), vzniká neštovička  
s červeným zaníceným lemem.

: přestup infekce do okolí vaku = zánětlivé hrboly může být i teplota

**Léčba :** přípravky s antibiotiky, dezinfekční roztok  
: zdlouhavá a obtížná



## FURUNKL

- nežit je zánětlivý, hluboce uložený, silně bolestivý hrbol
- příčinou je „zlatý stafylokok“ někdy velikosti i několika cm
- infekce se šíří do hloubky i do šířky, vzniká nekrotický čep= ten se pak provalí na povrch a dojde k vyprázdnění hnisu
- po zhojení zůstává drobná jizvička s hyperpigmentací
- může být kdekoliv na těle (nejčastěji na končetinách, hýždích, šíji)
- velké nebezpečí je v okolí vchodu nosního, na horním rtu nosoretní rýhy( přestup infekce do mozku= hnisavý zánět mozkomíšních blan)

**Léčba :** antibiotika( místní i celková), protizánětlivé, antiseptické přípravky



## FURUNKULOZA



- mnohačetné výsevy FURUNKLŮ po trupu a končetinách
- vzniká většinou u osob = s narušenou imunitou
  - = s cukrovkou
  - = s obezitou

**Léčba :** jako u furunklů

## KARBUNKL

- splynutí několika furunklů vedle sebe = veliký zánětlivý, bolestivý hrbol s flegmónou v podkoží
- provází = teplota, třesavka, celková nevolnost a slabost
- vznikají ze STAFYLOKOKŮ I STREPTOKOKŮ
- nejčastěji se vyskytují na zádech a šíji

**Léčba :** jako u FURUNKLU, ale je nutné chirurgické řešení a hospitalizace



## RŮŽE



- angína kůže, onemocnění kůže a podkoží vyvolané STREPTOKOKY
- nejčastěji postižen bérce a obličej ( může být ale kdekoliv)
- vstupní branou infekce jsou = dolní končetiny ( bércevé vředy)
  - = drobné rány, trhlinky, čerstvá nebo stará poranění po frakturách
  - = na obličejí trhlinky při nosním vchodu
  - = streptokoková rýma

**Projevy :** vysoká teplota, třesavka, zimnice, zvracení, bolesti hlavy  
: do dvou dnů se v místě postižení objeví zarudnutí a otok, rychle se šíří, je ohraničeno jazykovitými výběžky, někdy se objevují puchýře, kůže je lesklá

- často recidivuje ( opakuje se)
- u dětí a starých lidí toto onemocnění ohrožuje život

**Léčba :** antibiotika, místní aplikace chladivých obkladů ( ledové ), a protizánětlivé přípravky, klid na lůžku, masti ( ICHTAMOL nebo ICHTOXYL)

## **EKTYMA**

- chronické kožní onemocnění vyvolané  
STRAPTOKOKY

**Projevy** : velký krvavý puchýř se zánětem v okolí,  
obsah puchýře se zkalí = praskne= hnis  
zasychá ve špinavě šedohnědý strup  
: spodina podléhá nekróze, většinou u  
diabetiků a u lidí se sníženou osobní  
hygienou

**Léčba** : protizánětlivé přípravky a masti s  
antibiotiky



## **FLEGMONA**

- akutní hnisavý zánět podkožního vaziva, způsobený STAFYLOKOKY nebo STREPTOKOKY

**Projevy** : plošným zduřením a zarudnutím kůže s nepřesným ohraničením oproti okolí  
: doprovázena někdy vysokou teplotou  
: komplikuje různé poranění, operační rány.....

**Léčba** : jako u růže, vždy spolupráce s chirurgem !!!!!!!!!

